

Votre enfant a subi un choc sur la tête lors d'une chute...

Tout choc sur la boîte crânienne est un traumatisme crânien, il y a plusieurs niveaux de gravité.

Si l'enfant n'a pas été identifié comme ayant des critères de gravité (sur avis médical), il faut tout de même le surveiller de manière accrue pendant les 48 prochaines heures.

Vérifier au moins une fois que l'enfant est réveillable si la sieste se prolonge.

A FAIRE EN PRIORITE :

- **Regarder l'étendu de la blessure** : localité de l'impact, bleu, bosse, enfoncement du crâne, perte de connaissance ou non...
- **Rassurer l'enfant.**
- **Soulager l'enfant par un antidouleur** (paracétamol selon le poids de l'enfant, une poche de froid mise dans un gant sur sa bosse).
- Se noter l'heure du traumatisme et surveillance sur 48h.

Le traumatisme crânien léger (TCL) de l'enfant représente plus de 95% des traumatismes crâniens (TC).

Pour aider l'enfant à récupérer :

- Laissez-le se reposer au calme mais vérifiez s'il est réveillable si la sieste se prolonge.
- Proposez-lui à manger de manière habituelle sans le forcer.
- Surveiller l'apparition de symptômes (ci-dessous).

Certains symptômes peuvent persister de manière attendue : maux de tête modérés, fatigue, irritabilité, diminution d'appétit.

Si un des symptômes suivant apparaît :

- **Changement de comportement** : agitation ou calme inhabituel ;
- **Perte de connaissance** ;
- **Somnolence inhabituelle** ;
- **Raideur de la nuque**
- **Présence de liquide comme de l'eau qui coule de son nez ou de son oreille** juste après la chute ou **du sang qui coule par l'oreille** ;
- **Vomissements répétés** (supérieur à 3 vomissements) ou qui reviennent après avoir cessé ;
- **Trouble de l'équilibre, de la vue, de la marche ou de la parole** ;
- **Mouvements anormaux ou difficulté à utiliser un membre** : l'enfant n'utilise plus son bras ou sa jambe comme avant, paraît déséquilibré à la marche ou se plaint de vertiges ;
- **Maux de tête résistants aux anti-douleurs** ;
- **Pleurs inconsolables** ;
- **Convulsions ou mouvements involontaires répétés des bras et des jambes** (placer l'enfant dans un endroit où il ne peut pas tomber si c'est le cas, rester avec lui jusqu'à la fin de la convulsion et appeler aussitôt que possible le 15 ou amener l'enfant aux urgences s'il a repris connaissance).

Si un des symptômes suivant apparaît, consultez rapidement aux urgences (urgences pédiatriques de Villefranche 04.74.09.28.55) ou appelez le 15 !

